




ИНН: 2463134894; КПП: 246301001; ОГРН: 1242400028133

Юридический адрес: 660021, Красноярский край, город Красноярск, ул Богграда, дом 103, помещение 318
Р/С: 40702810223330002296, банк: филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», БИК: 045004774, корр. счет:
30101810600000000774

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «АМОРЭ»

 Двигун М. А.

«24» сентября 2025 г.

Информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи

Возможные риски и осложнения, сопутствующие медицинскому вмешательству (инъекционные и аппаратные методы в косметологии), которые могут развиваться во время или сразу после медицинского вмешательства, в том числе:

- Образование временного болезненного подкожного инфильтрата в области инъекций от введения препарата; воспалительная реакция в месте инъекции (отек, эритема, покраснение, и т.д.), которая может сопровождаться зудом, а так же болезненностью при надавливании. Подобная воспалительная реакция может сохраняться до 7 - 14 дней. Уплотнения и узелки, гранулематозные образования.
- Внутрикожные кровоизлияния, гематомы (до 2 – 3 недель);
- Жжение, зуд кожи, в области манипуляций;
- Гиперпигментация и вторичные телеангиоэктазии;
- Повреждение нервов, ожоги кожи, повышение температуры до 38 гр до 7 дней;
- Аллергические реакции на вводимые препараты и/или местные анестетики, в.т. анафилактический шок; дыхательные нарушения: затруднение вдоха, тяжесть за грудиной, кашель, чувство саднения, жжения в дыхательных путях;
- Развитие временной гиперпигментации и снижение кожной чувствительности в области медицинского вмешательства;
- Развитие венозного тромбоза от инъекционных препаратов, летального исхода.
- Неврологические нарушения: мигреноподобные боли, нарушения зрения, речи, транзиторные ишемические атаки и нарушения мозгового кровообращения;
- Длительное наличие папул («бугорков») внутрикожного расположения до 10 – 14 дней, развитие временной гиперпигментации и снижение кожной чувствительности в области медицинского вмешательства, которые исчезают через 2-12 месяцев;
- В редких случаях через 2-4 недели после аппаратных методов лечения лечения может появиться тонкая красноватая сосудистая «сетка» (телеангиэктазии), обычно самостоятельно исчезающая в течение 4-6 месяцев.

После проведения ботулинотерапии возможны местные и общие реакции:

Местные: Гематомы, отеки, повышенная чувствительность, болезненность, опущение бровей, брови «Мефистофеля», асимметрия бровей, верхних век, «тяжесть верхних век», отеки в области нижних век, птоз, диплопия, косоглазие, лимфостаз, двоение, увеличение избытков кожи, увеличение грыж в области нижних век, асимметрия углов рта, сухость глаз, слезотечение, перераспределение морщин, грыжевых мешков, асимметрия верхней и нижней губы, слюнотечение, онемение верхней губы, неба, нарушение артикуляции, дикции, жевательной функции, частичная потеря вкусовых функций, нарушение координации движений, компенсаторные морщины над бровями и в области внутреннего угла глаза, локальное воспаление, болезненность, зуд, жжение, чувство напряжения в месте инъекции, гиперемия, отек, гематомы, асимметрия, гиперкоррекция, присоединение вторичной и вирусной инфекции, нарушение пигментации, парезы, склеродермоподобные изменения, сыпь и отек в месте введения ботулотоксина.

Общие: Головная боль, повышение температуры, гриппоподобное состояние, тошнота, недомогание, астения, аллергические реакции (зудящая сыпь на туловище и верхних конечностях), отек гортани и голеней, токсические реакции, аутоиммунные реакции (кольцевидная гранулема, саркоидная гранулема, гранулематозные реакции, узловые высыпания, алопеция лица, мадароз брови, офтальмопатия, васкулит